

Тема 10. Невідкладна допомога при станах, що пов'язані з захворюваннями шкіри, анафілаксією та недостатністю ендокринних органів.

1. У перші години після субтотальної резекції щитоподібної залози з приводу тиреотоксикозу у хворої з'явилося виражене психічне і рухове збудження. Різка гіперемія обличчя, шиї, верхніх і нижніх кінцівок. Температура тіла 41°C, підвищена пітливість. Стрімко зростає тахікардія до 140-200/хв., миготлива аритмія. Яке ускладнення розвивається у хворої?

- A. Тиреотоксичний криз
- B. Анафілактичний шок
- C. Гіпопаратиреоз
- D. Інфаркт міокарда
- E. Асфіксія

2. У дівчини 19-ти років запідозрена недостатність наднирників (хвороба Аддісона). Що з нижчеперахованого може допомогти під час диференційної діагностики даної патології?

- A. Гіпонатріємія
- B. Гіперглікемія
- C. Артеріальна гіпертензія
- D. Гіпокаліємія
- E. Гіпотермія

3. У хворого з інфекційним ендокардитом з ураженням аортального клапану виник інтенсивний біль у попереку, зліва та справа, який був розцінений як інфаркт нирок. Протягом доби у хворого посилились загальна слабкість, апатія, тахікардія, артеріальний тиск знизився до 60/0 мм рт.ст., з'явилися блювання, пронос, холодний липкий піт, олігурія. Чим ускладнився перебіг захворювання?

- A. Гостра надниркова недостатність внаслідок крововиливу у наднирники
- B. Гостра ниркова недостатність внаслідок інфаркту нирки
- C. Гостра серцева недостатність
- D. Інфаркт селезінки
- E. Інфаркт мозку

4. До реанімаційного відділення доставлена хвора 48-ми років без свідомості. Шкіра холодна, бліда, суха, акроціаноз. Щільний набряк обличчя, тіла, гомілок, температура тіла 33°C. Сухожильні рефлекси мляві. Ps- 50/хв., малий, ритмічний. АТ- 90/60 мм рт.ст. Тони серця різко послаблені. Дихання рідке, глибоке. У крові: гіпохромна анемія, гіперхолестеринемія, високий рівень ТТГ крові. Який препарат необхідно призначити в першу чергу?

- A. Трийодтиронін
- B. Преднізолон
- C. Анаприлін
- D. Мерказоліл
- E. Глюкоза

5. Хворому 52-х років виконана екскреторна урографія. Через 10 хвилин після внутрішньовенного введення контрастної речовини стан хворого різко погіршився. Непритомний. АТ- 50/20 мм рт.ст., Ps- 120/хв., ритмічний. В анамнезі – медикаментозна алергія. З метою лікування необхідно ввести:

- A. Адреналін внутрішньовенно, швидка інфузія кристалоїдів
- B. Внутрішньом'язово димедрол, преднізолон
- C. Внутрішньовенно преднізолон, інфузія кристалоїдів
- D. Внутрішньовенно еуфілін
- E. Адреналін підшкірно, димедрол внутрішньовенно

6. Після субтотальної резекції щитоподібної залози у хворої почала наростати слабкість, сонливість, втомлюваність, з'явився набряк повік. Запідозрено гіпотиреоз. Для підтвердження діагнозу необхідно визначення:

- A. Рівня тиреотропного гормону (ТТГ) крові
- B. Рівня T3
- C. Рівня T4
- D. Рівня антитиреоїдних антитіл
- E. Рівня поглинання радіоактивного йоду

7. Після вживання м'яса свині, яка була зарізана у зв'язку з хворобою, яку лікували пеніциліном, у хворого на atopічну екзему розвинулись: сильний свербіж шкіри, набряк обличчя, уртикарні висипання по тулубу, верхнім кінцівкам. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. Медикаментозна токсикодермія
- B. Харчова токсикодермія
- C. Гостра кропив'янка
- D. Атопічний дерматит
- E. Гостра екзема

8. У чоловіка 21-го року, що страждає на цукровий діабет типу 1, раптово після швидкої ходи розвинулись різка слабкість, тремор, пітливість, психомоторне збудження, дисфазія. Об'єктивно: шкіра волога, періостальні рефлексії підвищені, симптом Бабінського (+). Які дії лікаря?

- A. Дати випити 200 мл соку або з'їсти 2-4 цукерки
- B. Внутрішньом'язово ввести 1 мг глюкагону
- C. Викликати бригаду швидкої допомоги
- D. Седативні засоби
- E. Дати вдихнути пари нашатирного спирту

9. У хлопчика 10-ти років після вжалення бджоли виникли біль у животі, задишка, запаморочення, на шкірі з'явилися уртикарні елементи висипки. АТ- 60/10 мм рт.ст. ЧСС- 140/хв. Які першочергові лікувальні заходи?

- A. Ввести адреналін 1:10000 підшкірно
- B. Призначити антигістамінні засоби всередину
- C. Ввести в/м глюконат кальцію
- D. Дати вдихнути випари нашатирного спирту
- E. Ввести кордіамін підшкірно

10. У дитини 8-ми років, яка під час поїздки на дачу з'їла багато полуниць, раптово з'явилась рожева папульозна та пухирчаста висипка на обличчі та тулубі. Висипка супроводжується значним свербіжем. Назвіть найбільш імовірний діагноз:

- A. Кропив'янка
- B. Раптова екзантема
- C. Інфекційна еритема
- D. Кір
- E. Реакційна укуси комарів